新型コロナウイルス
抗体検査のご案内

こんな方にお勧めです！

- ワクチン接種前や接種後に**抗体ができているか**確認したい
- ワクチン接種から時間が経ったけれど、**現在も抗体があるか**確認したい
- ワクチンは接種していないけれど、**過去の感染で免疫がついたか**確認したい

測定方法	新型コロナウイルスのスパイクタンパク質(S)に対する抗体 『新型コロナ抗体IgG(S)』を測定します
検査方法	採血による血液検査
検査料金（税込）	**5,０００円**　※健康診断時のオプション検査で実施の場合 6,０００円　※抗体検査のみで会場を設け実施する場合

結果は数値でご報告いたします。
0-50AU/ml未満が陰性、50 AU/ml以上が陽性です。

《参考》
2回接種67日後の平均値は　7,313 AU/ml、
2回接種97日後の平均値は　4,434 AU/ml　と徐々に減少します。

※注意事項※

◆ 新型コロナウイルスの免疫研究データは現状では少なく、抗体の持続期間は現時点では不明です。
◆ ワクチン接種後抗体ができるまで約２～３週間と言われています。接種後２週間未満では、抗体が検出されず陰性と判定されることがあります。
◆ 本検査結果の医師からの説明及び証明書や診断書の発行はいたしません。
◆ 本検査は新型コロナウイルスに対しての感染有無を直接的に診断するものではありません。

この検査についてのお問い合せ

千葉県厚生農業協同組合連合会
事業部推進企画課　☎０４３－２４５－７４６３